

Ist Dein Pferd zu dick oder zu dünn?

Beurteile jetzt Dein Pferd ganz einfach mit dem BCS

Body Condition Scoring (BCS) ist ein objektives System, um Ernährungszustand bzw. Fettreserven eines **Warmblut**¹-Pferdes einschätzen zu können. Beurteilt werden die Sicht- und Tastbarkeit von Knochenstrukturen sowie die äußerlich zugänglichen Fettreserven an 6 Körperregionen.

Der **Bauch** darf dabei **nicht** beurteilt werden (siehe www.marstall.de/body_condition_scoring_pferd).

1 AUSGEHUNGERT

Sehr abgemagert. Vorstehende Dorn- und Querfortsätze. Schulterknochen, Sitzbeinhöcker und 6.-18. Rippen komplett sichtbar. Haut nicht verschiebbar. Hüftknochen vorstehend. Knochenstrukturen an Widerrist und Hals erkennbar. Hungergrube eingefallen. Kein Fettgewebe.

2 SEHR DÜNN

Abgemagert. Dorn- und Querfortsätze, Schulterknochen, Sitzbeinhöcker, 7.-18. Rippe sichtbar. Haut nicht verschiebbar. Hüftknochen vorstehend. An Widerrist und Hals Knochenstrukturen schwach erkennbar. Hungergrube eingefallen.

3 DÜNN

Dornfortsätze sichtbar. Halsfläche leicht konkav, Halswirbel bei Druck fühlbar. Schultergräte sichtbar. Hautfaltenbildung schwierig. 7.-18. Rippe sichtbar. Haut nicht verschiebbar. Hüfthöcker vorstehend, vordere Kante scharf. Sitzbeinhöcker sichtbar. Linie Schweifansatz-Sitzbeinhöcker konkav. Hungergrube eingefallen.

4 MÄSSIG DÜNN

Halsfläche gerade, Kammfett² bis 4 cm. Schultergräte leicht und Teil der Rippen sichtbar. Haut etwas verschiebbar. Widerrist markant. Hüfthöcker vorstehend, vordere Kante scharf. Sitzbeinhöcker erahnbar. Linie Schweifansatz-Sitzbeinhöcker leicht konkav.

5 NORMAL

Halsfläche leicht konvex. Kammfett² 4-5,5 cm. Schultergräte erahnbar. Schulterhautfalte möglich. Rippen undeutlich sichtbar, aber gut zu fühlen. Haut verschiebbar. Hüfthöcker leicht erkennbar, vordere Kante rund. Fett um Schweifansatz leicht schwammig. Linie Schweifansatz-Sitzbeinhöcker gerade.



6 MÄSSIG DICK

Halsfläche leicht konvex. Kammfett² 5,5–7 cm. Hautfalte an Schulter leicht möglich. Rippen nicht sichtbar. Hintere Rippen (14.–18.) fühlbar. Haut leicht verschiebbar. Hüfthöcker erahnbar. Linie Schweifansatz–Sitzbeinhöcker konvex. Weiches Fett um Schweifansatz.

7 DICK


Halsfläche leicht konvex. Kammfett² 7–8,5 cm. Schulterfalte spannungsfrei möglich. Weiche Fettpolster über Rippen. Hintere Rippen mit Druck fühlbar. Fingerkuppen sinken etwas ein. Haut leicht verschiebbar. Hüfthöcker abgerundet, fühlbar. Kruppe weich. Linie Schweifansatz–Sitzbeinhöcker deutlich konvex. Weiches Fett um Schweifansatz.

8 FETT

Halsfläche leicht konvex. Kammfett² 8,5–10 cm. Gebiet um Widerrist und hinter Schulter mit Fett ausgefüllt. Schulterspeckfalte möglich. Rippen kaum fühlbar. Fingerkuppen sinken deutlich ein. Haut leicht verschiebbar. Hüfthöcker eingedeckt, aber fühlbar. Kruppe weich. Linie Schweifansatz–Sitzbeinhöcker deutlich konvex. Weiches Fett um Schweifansatz.


9 EXTREM FETT

Halsfläche konvex. Kammfett² >10 cm. Fettpolster bis Widerrist und Brust. Schulterspeckfalte spannungsfrei möglich. Rippen nicht fühlbar. Durchgehende Fettschicht an Brust, Rücken, Kruppe und rund um Schweifansatz. Hüfthöcker nicht mehr vorgewölbt erkennbar.



¹ Eingeschränkte Anwendbarkeit des BCS bei Warmblut-Pferden mit rassebedingt deutlich runden Formen wie bei Barock- und Westernpferden aber auch Tinkern & Co. Hier sollten die Zuchtmerkmale in die Beurteilung mit einfließen. D. h. ein höherer BCS an manchen Körperstellen kann normal sein. Gleiches gilt für Kaltblüter und Ponys.

² Kammfett richtig beurteilen: Bei **gesenkter Kopfhaltung** – z. B. beim Fressen – wird die **Höhe** des Kammfetts **oberhalb** der Halsmuskulatur gemessen.



Fachartikel und Glossar rund um Futter, Gesundheit und Fütterung:
www.marstall.eu



#Stallfamilie

marstall GmbH | Mühlenstr. 15 | D-87534 Oberstaufen
Noch Fragen: +49 (0) 8386 – 9333-15 oder info@marstall.eu

marstall[®]
Im Stall zu Hause